



Catálogo de especies

Reserva Natural Selva Vides

(IDENTIFICADAS A TRAVÉS DEL
MONITOREO DE BIODIVERSIDAD)



Autores

Awake Travel

- ▶ **Laura Romero**
Líder de Impacto
- ▶ **María Camila Ramos**
Coordinadora de proyectos e impacto
- ▶ **Camila Ariza**
Líder de procesos de conservación para anfitriones
- ▶ **Carlos Pedraza**
Experto en biodiversidad
- ▶ **Diego Lizcano**
Experto en biodiversidad
- ▶ **Flor Ángela Peña**
Experta local en biodiversidad
- ▶ **Daniela Neira**
Gestora de destinos y anfitriones
- ▶ **Lucero Azcárate**
Gestora de destinos y anfitriones
- ▶ **Mónica Ordóñez**
Gestora de destinos y anfitriones

Esta iniciativa es financiada por el **Gobierno del Reino Unido**, a través del **Programa UK PACT** (Partnering for Accelerated Climate Transitions).



Ilustraciones


Avifauna Colombiana ®
(aves).

A Vuelo de Pájaro ®
(mamíferos y anfibios).

Diseño Gráfico & Producción

- ▶ Oscar Niño
- ▶ Juan Báez
- ▶ Felipe León





Anfitrión

Germán Pantoja

Reserva Natural Selva Vides.





La **reserva Natural Selva Vides** es una iniciativa campesina asociada desde el año 2016 compuesta por **10 familias**, que buscan conservar el territorio a través del turismo de naturaleza con fines científicos y educativos. **Está ubicada en la vereda Alto Vides, Villagarzón, Putumayo.** Esta iniciativa es liderada por Germán Pantoja quien busca hacer sostenible su proceso de conservación y fortalecer los procesos organizativos de la región. A largo plazo, la **Reserva Natural Selva Vides**, busca ser un centro de investigación natural con enfoque científico y académico que brinde formación a jóvenes y sea un **promotor de conservación en la región Andinoamazónica.**

Ver/Escuchar
la reserva



Link de la
reserva eBird






Introducción

Este catálogo nace en el marco del **Proyecto de mejora del turismo sostenible (STEP) - Fase 3: Impulsar la conservación y la reducción de emisiones a través del turismo y la tecnología**, como resultado de un proceso de dos años de monitoreo de biodiversidad, donde la **Reserva Natural Selva Vides**, en conjunto con **Awake Travel** han implementado un **proceso de monitoreo acústico y fototrampeo** con el fin de identificar las especies que hacen presencia en el territorio e identificar cuales de ellas son de **interés para el desarrollo del turismo de naturaleza, como un medio de vida sostenible que potencia procesos de conservación y restauración.**







Contexto geográfico

La **Reserva Natural Selva Vides** está ubicada en el municipio de Villagarzón en el departamento del Putumayo. **Situada en la confluencia de los Andes y la cuenca del Amazonas.** Biogeográficamente los bosques de esta región tienen características ecológicas tanto de **los Andes como de la Amazonia**, demostrando altos niveles de biodiversidad, especialmente de aves, mamíferos y ranas. **En el piedemonte nacen los ríos Putumayo y Caquetá**, que son corrientes laterales del río Amazonas que bajan a las tierras bajas a través de bosques predominantemente continuos.







¿Cómo usar esta guía?

En este catálogo podrás encontrar algunas de las especies más carismáticas o de interés para el avistamiento de fauna de la Reserva Natural Selva Vides, en particular de aves, mamíferos y algunos anfibios). Algunas de estas especies se identificaron a través del proceso de monitoreo acústico y de fototrampeo y otras de ellas, ya se encontraban en los inventarios de fauna del anfitrión.

En cada página podrás encontrar una ilustración de la especie, el nombre común o local de la misma y, entre paréntesis, en letras *itálicas*, su nombre científico. Además, encontrarás una breve descripción de la especie.

También encontrarás algunas convenciones con información de interés como:



Tamaño



Hábitat



Estado de conservación



Alimentación






Adicionalmente, encontrarás códigos QR para ampliar la información de cada especie



Por último, al final del catálogo encontrarás un listado con el total de especies identificadas dentro de los procesos de monitoreo, liderado por el anfitrión y Awake Travel.

Esperamos que disfrutes este catálogo y haga tu experiencia en la Reserva Natural Selva Vides mucho más enriquecedora.







Aves





HORMIGUERO CARIBLANCO

(Gymnopithys leucaspis)

Hormiguero distintivo con anillo ocular azul pálido, partes inferiores blancas como la nieve y partes superiores ferruginosas. La ceja y la mejilla negras se extienden hacia abajo, a través de los lados del cuello y los flanco. Es casi siempre encontrada siguiendo regueros de hormigas.



Link a eBird



Ver/Escuchar especie



Tamaño
13 cm



Hábitat
Bosque



Estado de conservación
Preocupación menor



Alimentación
Insectos



HALCÓN DEL BOSQUE DE CUELLO BLANCO

(*Micrastur buckleyi*)

Pálido y moteado de gris con cabeza grande; es más grande que otros pájaros estaca y carece de bigote oscuro. Se camufla bien y es difícil de detectar.

Link a eBird



Ver/Escuchar especie



Tamaño
30 a 40 cm



Hábitat
Bosque



Estado de conservación
Preocupación menor



Alimentación
Aves, roedores y reptiles



PAUJIL NOTURNO, PAUJIL COLORADO

(*Nothocrax urumutum*)

Tiene cresta larga y corona negras. El plumaje del dorso, alas y cola es castaño con visos negruzcos. El vientre es color canela. Presenta el pico rojo, el borde supraorbital amarillo y el suborbital azul, unidos como una elipse. Las patas son rosadas.



Link a eBird



Ver/Escuchar especie



Tamaño

65 a 71 cm de alto



Hábitat

Bosque



Estado de conservación

Preocupación menor



Alimentación

Frutas, insectos y pequeños vertebrados



PERDÍZ CORCOVADA, CODORNÍZ

(Odontophorus gujanensis)

Marrón con piel roja alrededor del ojo. Más gris en la nuca con algunas marcas beige finas en el resto del cuerpo.

Link a eBird



Tamaño
24 a 29 cm



Hábitat
Bosque



Estado de conservación
Casi amenazado



Alimentación
Frutas, semillas e insectos



PAVA AMAZÓNICA, PAVA TARRO

(Penelope jacquacu)

Posee copete con plumas bordeadas de blanco; el plumaje en el cuello y la nuca es negruzco con estrías blancas, en el cuerpo es castaño a oliváceo o a veces en los machos, negruzco; en el vientre es rufo o rojizo. Tiene una garganta roja desnuda.



Link a eBird



Ver/Escuchar especie



Tamaño
76 a 84 cm



Hábitat
Bosques y sotobosques



Estado de conservación
Preocupación menor



Alimentación
Frutos



QUETZAL PAVONINO, QUETZAL DE PICO ROJO

(Pharomachrus pavoninus)

Verde iridiscente con vientre rojo brillante, pico rojo y parte inferior de la cola negra. Las hembras tienen el dorso verde iridiscente, el vientre rojo y grisáceo, la cabeza oscura y el pico rojizo oscuro. La parte inferior de la cola en las hembras es negra con una ligera barra blanca.



Link a eBird



Ver/Escuchar especie



Tamaño
45 a 50 cm



Hábitat
Bosque



Estado de conservación
Preocupación menor



Alimentación
Insectos y frutas



HORMIGUERO EMPENACHADO

(Pithys albifrons)

Es un pájaro pequeño, mide alrededor de 14 cm. Posee un plumaje de un intenso marrón rojizo en sus partes inferiores, cola, obispillo y nuca; alas y dorso negros; y cabeza negra con una máscara de plumas prominentes de un blanco brillante, muy característica y que le hace difícil de confundir. No hay un dimorfismo sexual claro. Los juveniles son de coloración más apagada, y las plumas blancas de la cabeza no están presentes o lo hacen de manera reducida; tampoco tienen la nuca rojiza, si no negra.



Link a eBird



Ver/Escuchar especie



Tamaño
12 a 15 cm



Hábitat
Bosques y sotobosques



Estado de conservación
Preocupación menor



Alimentación
Insectos



OROPÉNDOLA OLIVA

(*Psarocolius bifasciatus*)

Verde oliva con alas marrón rojizo y una cola amarilla brillante. El pico es negro con un parche rosado en la base y la punta anaranjada.

Link a eBird



Ver/Escuchar
especie



Tamaño
Macho: 47 a 53 cm
Hembra: 41 a 43 cm



Hábitat
Bosque




Estado de conservación
Preocupación menor



Alimentación
Omnívoro, pequeños vertebrados, insectos grandes, néctar.

TROMPETERO

(Psophia crepitans)



El cuerpo es redondeado; las patas largas y fuertes adaptadas a sus hábitos eminentemente terrestres; el cuello largo y el pico corto y amarillo. El plumaje es negro o negro-azulado con las alas grises. Rara vez vuelan y solo por cortas distancias. Pueden nadar.

Link a eBird



Tamaño

48 a 56 cm / 1,3 kg



Hábitat

Bosque



Estado de conservación

Preocupación menor



Alimentación

Frutas, semillas e insectos

TUCÁN PECHIBLANCO, YATARO

(*Ramphastos tucanus*)

Tucán grande, blanco y negro, de bosques de tierras bajas. Su pico tiene entre 14 y 18 cm de largo. Ambos sexos con las plumas negras en la parte superior y con la parte alta de la cola de color amarillento o blanco; pico con una tira en el culmen de color verde y amarillo. La hembra posee un pico más corto que el del macho.

Link a eBird



Ver/Escuchar especie



Tamaño
50 a 60 cm / 600 g



Hábitat
Bosque



Estado de conservación
Vulnerable



Alimentación
Frutos y vertebrados pequeños



GALLITO DE ROCA

(*Rupicola peruvianus*)

Una de las aves icónicas de los Andes. Bastante grande, significativamente más grande y más rechoncha que un zorzal. Se encuentra en el bosque nuboso a elevaciones medias, más a menudo al amanecer en un sitio de despliegue, donde los machos hacen chillidos como cerdos, y saltan y bailan para las hembras. A veces se ve en otras partes del bosque, especialmente en árboles con frutos. Los machos pueden ser carmesí brillante o anaranjados, siempre con alas negras, terciarias plateadas anchas, patas anaranjadas y cresta redondeada hinchada. La hembra es marrón con cresta más pequeña.



Link a eBird



Tamaño
31 a 33 cm



Hábitat
Altos y húmedos bosques de neblina de la Amazonía



Estado de conservación
Preocupación menor



Alimentación
Insectos y frutas





TUCANETA

(*Selenidera reinwardtii*)

Tucán atractivo con un pico grueso del bosque lluvioso de tierras bajas. Los machos son negros arriba, marrones abajo, con un parche amarillo que se extiende a través del ojo; las hembras son similares pero son rojo-marrón arriba.

Link a eBird



Tamaño
33 a 35 cm



Hábitat
Bosque y bordes de bosque



Estado de conservación
Preocupación menor



Alimentación
Frutos





TÁNGARA DEL PARAÍSO, TÁNGARA DE 7 COLORES

(Tangara chilensis)

Tángara pequeña, increíblemente coloreada de las tierras bajas de la Amazonía. La cabeza verde brillante contrasta con el cuerpo rojo, azul y negro. Se encuentra en el dosel del bosque húmedo, a menudo en bandadas de especies mixtas.

Le gusta mantenerse alto en el dosel, pero ocasionalmente se mueve más bajo a la parte media, desplazándose rápidamente entre las perchas mientras forrajea.



Link a eBird



Tamaño
13 cm



Hábitat
Dosel y bordes de bosque



Estado de conservación
Preocupación menor



Alimentación
Frutas y semillas



GALLINETA

(*Tinamus guttatus*)

Ave sigilosa que se pasea por el suelo dentro del bosque, parecida a una gallina. Muy reconcha; parece que no tuviera cola. Tinamú grande pero más pequeño que el similar Great Tinamou (*Tinamus major*). Es bastante común y extendido en bosques amazónicos de tierras bajas, ocasionalmente presente incluso en estribaciones. Mucho más escuchado que visto.

Link a eBird



Ver/Escuchar especie



Tamaño
20 cm de alto



Hábitat
Zonas pantanosas, con
palmas del género *Mauritia*.



Estado de conservación
Casi amenazado



Alimentación
Insectos

TINAMÚ

(*Tinamus osgoodi*)

Presenta color negruzco en todo su cuerpo, excepto en el vientre que es más claro, como hollín, y debajo de la cola, donde es de color rufo.



Link a eBird



Ver/Escuchar especie



Tamaño
40 a 46 cm



Hábitat
Bosque



Estado de conservación
Vulnerable



Alimentación
frutas y semillas



Mamíferos y anfibios



Ver/Escuchar
especie



MONO NOCTURNO, MACACO DE NOCHE

(Aotus vociferans)

El pelaje es de color oscuro y corto, la coloración es grisácea; las manos y los pies son de un color más claro que el dorso. El vientre posee un color amarillento. Posee una espiral interescapular con pelos dirigidos centrífugamente



Tamaño
20 a 25 cm / 2 a 3 kg



Hábitat
Bosque



Estado de conservación
Preocupación menor



Alimentación
Frutas e insectos, néctar y polen



BORUGA, LAPA, GUAGUA

(*Cuniculus paca*)

Está cubierta por un pelaje hispido de color pardo o anaranjado, con bandas de manchas blancas redondeadas. La cabeza es grande, las mejillas son abultadas, las orejas son cortas, marrones, las vibrisas son largas, los ojos son grandes y bien separados.

Ver/Escuchar
especie



Tamaño
30 a 35 cm de longitud



Hábitat
Bosque



Estado de conservación
Preocupación menor



Alimentación
Frutas y semillas





ÑEQUE, GUARA

(*Dasyprocta fuliginosa*)

Color marrón-negro a rojizo, cada uno de sus miembros anteriores posee 4 dedos con uñas, que usan para sostener los alimentos y cada pata posterior tiene 3 dedos y mide entre 12 y 14 cm de largo.

Ver/Escuchar especie



Tamaño
41 a 66 cm de longitud



Hábitat
Bosque



Estado de conservación
Preocupación menor



Alimentación
Frutas y semillas



ARMADILLO

(Dasypus novemcinctus)

Es un mamífero acorazado de cuerpo pequeño que, a pesar de sus cortas patas, se mueven con gran rapidez. Las patas poseen garras semejantes a uñas que les permiten excavar la tierra para crear sus madrigueras. La característica más asombrosa en estos animales, es la aparición de placas dérmicas (osteodermos) cubiertas de placas epidérmicas muy parecidas a las escamas de los reptiles.

Ver/Escuchar especie



Tamaño

50 a 60 cm / 4 a 8 kg.



Hábitat

Bosque



Estado de conservación

Preocupación menor



Alimentación

Frutas, semillas e insectos


Ver/Escuchar
especie



TIGRILLO, OCELOTE

(*Leopardus pardalis*)

Especie de tamaño mediano dentro de los felinos, pero el más grande de los gatos. Los machos son algo más grandes que las hembras. Es una especie terrestre, solitaria y de hábitos tanto diurnos como nocturnos. Este carnívoro oportunista con preferencias a ciertas presas de roedores grandes, raposas, murciélagos, aves, reptiles y peces, puede cazar en los árboles, pero es especialista de caza en el suelo.



Tamaño
70 a 90 cm de longitud



Hábitat
Bosque



Estado de conservación
Preocupación menor



Alimentación
Carnívoro (aves, mamíferos, peces y reptiles)

VENADO

(*Mazama americana*)

El lomo tiene un aspecto ligeramente encorvado y el anca es visiblemente alta en comparación con los hombros. En ambos sexos el color es pardorojizo a pardogrisáceo y posee una coloración más clara en la parte inferior de la mandíbula, pecho, vientre y zona perineal. En las crías la coloración es semejante a la de los adultos, pero con manchitas blancas. A partir del año de vida los machos desarrollan un par de astas simples, cortos, rectos y dirigidos hacia atrás.



Ver/Escuchar especie



Tamaño

65 a 75 cm de altura, 140 cm de longitud / 20 a 30 kg.



Hábitat

Bosque



Estado de conservación

Preocupación menor



Alimentación

Hervívoro (hojas ramas y frutas)



Ver/Escuchar
especie



ARDILLA COLORADA

(Notosciurus granatensis)

El color del pelo del cuerpo varía en las 30 subespecies. La coloración está de todos modos marcada por un color marrón castaño rojizo oscuro. En el dorso presenta un moteado de color variable, del negro grisáceo con tinte amarillento, al negro de carbón oscuro con visos amarillos. La cola siempre es de color castaño rojizo a rufo, a menudo entremezcla con pelos negros y a veces con una punta de color negro.



Tamaño
10 a 28,5 cm de longitud



Hábitat
Bosque



Estado de conservación
Preocupación menor



Alimentación
Frutas y semillas



JAGUAR

(*Panthera onca*)

Las hembras suelen ser un 10-20 % más pequeñas que los machos. Su cabeza es voluminosa y con una mandíbula prominente; el color de sus ojos varía de un tono amarillo oro a un amarillo verdoso y sus orejas son relativamente pequeñas y redondeadas.

Ver/Escuchar especie



Tamaño

110 a 180 cm, cola de 70 a 100 cm



Estado de conservación

Casi amenazado



Hábitat

Bosque



Alimentación

Carnívoro (aves, mamíferos, peces y reptiles)



Ver/Escuchar
especie



PUERCO DE MONTE - CERRILLO

(Pecari tajacu)

Se caracteriza por un pelaje de cerdas castaño negruzcas y una mancha blanca que recuerda a un collar en la base del cuello. En el lomo tiene una cavidad glandular de 12 a 1 cm de la que secreta un aceite de olor almizclado.



Tamaño

70 a 110 cm de longitud



Hábitat

Bosque



Estado de conservación

Preocupación menor



Alimentación

Insectos y frutas



PUMA

(*Puma concolor*)

La coloración del puma es uniforme (de ahí el nombre latino concolor), pero puede variar mucho entre los individuos e incluso entre hermanos. El pelaje es generalmente dorado, pero puede ser de color gris plateado o rojizo, con ligeros parches en el cuerpo, incluidas cerca de las mandíbulas, la barbilla y el cuello.

Ver/Escuchar especie



Tamaño

53 a 82 cm de altura



Hábitat

Bosque



Estado de conservación

Preocupación menor



Alimentación

Carnívoro (aves, mamíferos, peces y reptiles)

**Nombre científico - Especie****Nombre común**

<i>Cacicus cela</i>	Arrendajo - Cacique
<i>Buteo magnirostris</i>	Gavilán Pollero
<i>Ortalis guttata</i>	Guacharaca - Chachalaca
<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	Trepatroncos Pico Fuerte
<i>Ceratopipra erythrocephala</i>	Manakin Cabecidorado - Saltarin De Cabeza Dorada
<i>Mionectes oleagineus</i>	Mosquero Aceitunado
<i>Trogon viridis</i>	Pizca De Monte - Trogon Coliblanco
<i>Aramides cajaneus</i>	Chilaco - Chiricote
<i>Automolus ochrolaemus</i>	Ticotico Gorgiclaro - Horajasquero Gorgianteado
<i>Cyanocorax violaceus</i>	Urraca - Piojosa - Polluelo - Carriqui
<i>Patagioenas speciosa</i>	Paloma Escamosa - Paloma Guacoa
<i>Pulsatrix melanota</i>	Cosongo - Búho De Anteojos - Lechuzón Barrado
<i>Lepidothrix coronata</i>	Saltarín Corona Azul - Saltarín Coronado
<i>Megarynchus pitangua</i>	Bienteveo - Mosquitero Picudo
<i>Psarocolius decumanus</i>	Oropéndola De Pico Blanco - Muchilero De Pico Blanco
<i>Patagioenas plumbea</i>	Paloma Plomiza
<i>Celeus elegans</i>	Carpintero Elegante - Carpintero Castaño
<i>Psarocolius viridis</i>	Oropéndola Verde - Muchilero De Pico Rojo
<i>Rhytipterna simplex</i>	Planidera Gris - Planidera Amazónica
<i>Glyphorynchus spirurus</i>	Trepatroncos Picocuña
<i>Euphonia chrysopasta</i>	Frutero De Vientre Dorado
<i>Euphonia rufiventris</i>	Fruterito De Vientrie Rufo
<i>Pachyrhamphus marginatus</i>	Anambe Capirotado



**Nombre científico - Especie****Nombre común**


<i>Willisornis poecilinotus</i>	Hormiguero Escamado
<i>Dendrocolaptes certhia</i>	Trepatroncos Barrado
<i>Cnipodectes subbrunneus</i>	Mosquero Rufo
<i>Attila spadiceus</i>	Atila Polimorfo
<i>Crypturellus variegatus</i>	Panguana
<i>Myiozetetes similis</i>	Bienteveo Mediano - Luís Grenario - Chepio
<i>Columbina talpacoti</i>	Torcaza - Abuelita
<i>Capito auratus</i>	Capitan Dorado - Torito Filgrama - Torito Dorado
<i>Trogon rufus</i>	Surucua Amarillo - Pizca De Monte
<i>Saltator grossus</i>	Pepitero Pizarroso
<i>Psarocolius angustifrons</i>	Muchilero - Oropéndola
<i>Micrastur gilvicollis</i>	Halcón Montes Cabecigris
<i>Loriotus luctuosus</i>	Frutero Negro
<i>Ornithion inerne</i>	Mosquerito Moteado
<i>Penelope jacquacu</i>	Pava Tarro
<i>Nothocrax urumutum</i>	Paujil Colorado - Paujil Nocturno
<i>Tinamus guttatus</i>	Gallineta
<i>Pharomachrus pavoninus</i>	Quetzal
<i>Tinamus osgoodi</i>	Tinamú Negro
<i>Gymnopithys leucaspis</i>	Hormiguero Cariblanco
<i>Selenidera reinwardtii</i>	Tucaneta
<i>Micrastur buckleyi</i>	Descabezador
<i>Pithys albifrons</i>	Hormiguero Empenachado






Nombre científico - Especie	Nombre común
Ramphastos tucanus	Yátaro - Diostede - Tucán - Picón
Psarocolius bifasciatus	Cacique De Para - Muchilero De Montaña
Tachyphonus luctuosus	Parlotero Aliblanco
Ramphocaenus melanurus	Soterillo Picudo
Baryphthengus martii	Barranquero - Buro
Psophia crepitans	Tente - Trompetero
Tangara chilensis	Tángara Del Paraiso - Tángara 7 Colores
Ruphicola peruviana	Gallito De Roca
Aotus sp	Tutamono - Mono Nocturno
Aotus vociferans	Mono Nocturno, Macaco De Noche
Cuniculus paca	Boruga, Lapa, Guagua
Dasyprocta fuliginosa	Ñeque, Guara
Dasypus novemcinctus	Armadillo, Gurre
Leopardus pardalis	Tigrillo, Ocelote
Mazama americana	Venado Colorado
Panthera onca	Jaguar
Pecari tajacu	Cerrillo
Puma concolor	Puma
Notosciurus granatensis	Ardilla Colorada
Tamandua tetradactyla	Oso Hormiguero, Oso Melero
Mazama nemorivaga	Venado Chonto











COLOMBIA
UK PACT



awake

